

Nimi \_\_\_\_\_ Henkilötunnus \_\_\_\_\_

Puoliso \_\_\_\_\_ Henkilötunnus \_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_ Puh. \_\_\_\_\_

Lähtävä lääkäri \_\_\_\_\_ Vastaus lähetetään \_\_\_\_\_

**Tutkimuspyyntö**     perusanalyysi     pakastus     IVF-hoito     TESE-hoito  
 suppea analyysi     sterilisaatiokontrolli     ICSI-hoito  
 vasta-aineet     DNA-fragmentaatiotesti     AIH / AID

Näyte on otettu \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_  masturbaatio  muu, miten \_\_\_\_\_Näyte on täydellinen  kyllä  loppuosa puuttuu  alkuosa puuttuu    Pidättäytymisaika \_\_\_\_\_ vrk.Siemennestetutkimus on tehty aiemmin  ei  kyllä, missä ja milloin? \_\_\_\_\_**Laboratorio täyttää:** \_\_\_\_\_

Näyte on tuotu laboratorioon klo \_\_\_\_\_ Näytteen vastaanotti \_\_\_\_\_ Henkilöllisyys kysytty + / -

TILAVUUS (&gt;1.5 ml) \_\_\_\_\_ ml

SIITTIÖITIHEYS (&gt; 15 milj/ml) \_\_\_\_\_ milj/ml    YHTEENSÄ \_\_\_\_\_ milj

ESIASTEITA (&lt; 1.5 milj/ml) \_\_\_\_\_ milj/ml    VALKOSOLUJA \_\_\_\_\_ milj/ml

SIITTIÖIDEN LIKKUVUUS (&gt; 32 % a + b)    A \_\_\_\_\_ %    B \_\_\_\_\_ %    C \_\_\_\_\_ %    D \_\_\_\_\_ %    \_\_\_\_\_ t

AGGLUTINAATIO     ei     lievä     selvä

VASTA-AINEET    SpermMar (&lt; 10 %)    IgG \_\_\_\_\_ %    IgA \_\_\_\_\_ %

SIITTIÖIDEN RAKENNE    normaaleja (&gt; 4.0 %)    \_\_\_\_\_ %

epämuotoinen pää    \_\_\_\_\_ %

epämuotoinen kaula / keskikappale    \_\_\_\_\_ %

epämuotoinen häntä    \_\_\_\_\_ %

sytoplasmiset pisarat    \_\_\_\_\_ %

rakenneindeksi (TZI) (&lt; 1.6)    \_\_\_\_\_

SIITTIÖIDEN DNA-FRAGMENTAATIO    \_\_\_\_\_ %

**PESUTULOS**    tiheys \_\_\_\_\_ milj/ml    liikkuvuus    A \_\_\_\_\_ %    B \_\_\_\_\_ %    C \_\_\_\_\_ %    D \_\_\_\_\_ %  
(Gradienttipesu + swim up)

Muu käsittely? \_\_\_\_\_

Pesukäsittelyn näytteen luovutti \_\_\_\_\_ Naisen henkilöllisyyden tarkisti \_\_\_\_\_

PA/061016, PA/101217

## Ohjeet siemennestenyttien antamiseen

1. Varaa näytteelle tutkimusaika puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme chatin kautta. Näytteen voi antaa klinikalla tai kotona.
2. Näytepurkin voi hakea InOvasta. Vaihtoehtoisesti näyteastiaksi käy puhdas tiiviskantinen purkki (esim. pakasterasia). Merkitse näytepurkin kylkeen oma nimesi ja syntymäaika.
3. Pidättäytymisaika ennen näytteenottoa olisi hyvä olla 2 – 4 vrk, ei yli 7 vrk.
4. Pese kädet ja suorita alapesu ennen näytteenottoa.
5. Ota näyte masturbaatiolla suoraan näytepurkkiin. Kondomia tai keskeytettyä yhdyntää ei voi käyttää.
6. Pyri saamaan **koko** siemennestemäärä talteen. Mikäli osa menee hukkaan, tee siitä merkintä läheteeseen tai kerro klinikan henkilökunnalle.
7. Sulje purkin kansi huolellisesti.
8. Toimita näyte 1 tunnin kuluessa laboratorioon. Näytepurkki tulee pitää **lämpimänä** (esim. taskussa villasukkaan käärittynä) koko kuljetuksen ajan, jotta siittiöt eivät kuole.

Tarvittaessa lisätietoa voit kysyä InOvasta puh. 017 263 1700.

Lomake toimii lähetteenä siemennesteen tutkimukseen. Kela-korvaus voidaan myöntää, jos taustalla on raskaustoive. Tällöin tarvitsemme myös puolison nimen ja syntymäajan.

**InOva klinikka Oy – Hedelmällisyystutkimukset ja lapsettomuushoidot Kuopiossa.**